



Nombre Comercial : IANSAFRUT ZINC
Grupo : FERTILIZANTE
Tipo : Corrector de carencia
Comercializado por : Empresas Iansa – Insumos Agrícolas

> **COMPOSICIÓN**

	% p/v
Zinc (ZnO)	8%
Complejado con Azúcares y Ác. Orgánicos	

pH	4,0-5,0
Densidad g/ml	1,20

> **PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS**

IANSAFRUT ZINC es un corrector de deficiencias líquido en base a un complejo orgánico, soluble en agua y formulado para aplicación foliar.

Beneficios del Producto

- Estimula la fotosíntesis.
- Aumento de tamaño de hojas, brotes y frutos.
- Aumenta viabilidad del Polen.
- Evita clorosis (hojas amarillentas).
- Forma parte de la zeatina, precursora de citoquininas.
- Amplio espectro de acción.
- Acción sistémica y prolongado efecto.

Compatibilidad

IANSAFRUT ZINC es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios en uso, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

Preparación de la mezcla

IANSAFRUT ZINC se puede adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador lleno hasta la mitad con agua y completar a volumen total mientras se agita.

Para resultados óptimos, aplicar en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

Período de Carencia

No tiene restricciones de carencia

Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Usar protección adecuada, lavarse las manos después de realizado el trabajo y antes de comer
- Eliminar el envase luego de la aplicación
- No almacenar con productos alimenticios
- Elimine el envase una vez vacío realizando un triple lavado. Luego destrúyalo y deposítelo en un lugar habilitado por la autoridad competente.

Fitotoxicidad

No es tóxico en los cultivos y dosis recomendadas. Puede aplicarse dirigido al follaje, frutos y brotes procurando un mojamiento y uniformidad adecuada.



> RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis L/Ha	Concentración cc/100L	Momento de Aplicación
Pomáceas	1,5-2,0	150-200	Aplicar desde puntas verdes. Realizar 3-4 aplicaciones.
Carozos, Cerezos	1,5-2,0	150-200	Aplicar a inicio de floración (1-2 aplicaciones) y repetir post-cuaje hasta quiebre de color, realizar 2-4 aplicaciones.
Uva de mesa, Uva vinífera	1,5-2,0	150-200	Aplicar con brote de 20 cm hasta floración, 2-3 aplicaciones. También desde cuaja hasta pinta, realizar 2-3 aplicaciones.
Paltos, Cítricos, Olivos	1,5-2,0	150-200	Aplicar en floración junto con IansaFrut Boro. Repetir en brotes rojos, realizando 2 aplicaciones cada 15 días.
Avellano europeo, Nogales, Almendros	1,5-2,0	150-200	Aplicar en floración junto con IansaFrut Boro. Repetir en brotación, realizando 2 aplicaciones cada 15 días.
Berries, Arándanos, Frutillas, Frambuesas	1,5-2,0	150-200	Aplicar en floración y durante crecimiento de fruto, realizar 2-3 aplicaciones.

> PRESENTACIÓN (ENVASES)

Litros
20

Empresas Iansa S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento. Esta garantía no libera al usuario a tomar medidas seguras para su uso; como condiciones de almacenaje, preparación de la mezcla, aplicación..., las cuales puedan generar eventuales daños, liberando de cualquier responsabilidad al distribuidor y el fabricante. El usuario será responsable de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y/o etiqueta. Los productos cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, para evitar la manipulación por terceros y que sean adulterados, por tanto el usuario debe exigir esta condición al recibirlos.



**Importado y distribuido por
Empresas Iansa.**
Rosario Norte 615, Piso 23
Las Condes, Chile.
Teléfono: (56) 2 2571 5400
Mail: contacto@iansa.cl